



## DERATION

### Esca topicida-ratticida pronta all'uso a base di Bromadiolone

Presidio Medico - Chirurgico. Per uso civile.

Registrazione Ministero della Sanità n.12981

#### Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:

Bromadiolone .....g 0,005  
Sostanze appetenti  
ed adescanti .....q.b. a g 100

#### Caratteristiche

La ricerca di nuovi rodenticidi capaci non solo di combattere la resistenza sviluppatasi verso gli anticoagulanti tradizionali nel *Rattus rattus*, nel *Rattus norvegicus* e nel *Mus musculus*, ma anche di migliorare il controllo nei roditori non-resistenti, ha portato allo sviluppo di una nuova generazione di anticoagulanti dotati di eccezionali qualità sia come ratticidi, sia come topicidi.

**DERATION** è un'esca rodenticida che appartiene a questa nuova categoria di anticoagulanti.

I dati della sperimentazione condotta dall'Istituto di Farmacologia dell'Università di Bologna indicano che un solo giorno di alimentazione con **DERATION** è in grado di provocare la morte del 100% dei ratti e dei topi.

E' importante sottolineare che i decessi non avvengono subito, ma soltanto dopo alcuni giorni dalla cessazione del trattamento con **DERATION**. Non si verificano perciò rifiuti verso il **DERATION** come accade invece normalmente con i ratticidi ad effetto acuto (scilla marina, ecc.).

**DERATION** è da 6 a 10 volte più potente rispetto alle esche a base di anticoagulanti della vecchia generazione (Warfarin, Clorofacinone, ecc.). Come gli altri anticoagulanti, agisce opponendosi alla formazione della protrombina necessaria alla coagulazione del sangue provocando delle emorragie letali.

#### Tossicità

LD50 a.o. convenzionale su ratto (D.M. 25/06/90):  
Bromadiolone ..... 1,1mg./kg.

#### Impiego

**DERATION** viene rapidamente accettato dalle diverse specie di roditori, grazie agli appetenti e coformulanti alimentari di prima scelta impiegati per la sua formulazione.

Una delle regole essenziali per ottenere buoni risultati, è quella di mantenere a disposizione dei roditori un quantitativo di esche esuberante e disposte in punti vicini fra loro. In questo modo i roditori possono incontrarle e consumarle facilmente, senza dovere entrare in competizione fra loro.

Nella prima fase della derattizzazione è importante che i punti di distribuzione siano spesso controllati (anche giornalmente) per reintegrarli di esca in modo da consentirne un regolare consumo nell'arco dei primi 2-3 giorni.

**DERATION** è disponibile in varie formulazioni, che ne permettono l'impiego in ogni condizione (luoghi umidi, locali polverosi, presenza di sorgenti di cibo competitive, ecc), soprattutto se associate all'uso di adatti erogatori (RISTORAT, BAIT DISPENSER, ecc).

#### Avvertenze

Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso.

Ulteriori importanti informazioni inerenti il prodotto sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Poichè la Colkim non esercita alcun controllo sul modo d'impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità in merito all'utilizzazione dello stesso.

#### Classificazione

In base alle norme vigenti in materia di Classificazione, Imballaggio ed Etichettatura dei preparati pericolosi - PMC, **DERATION** è classificato NON PERICOLOSO e perciò in etichetta non è riportato alcun simbolo di pericolosità.

Publicazione riservata a personale sanitario qualificato.